ALFASIGMA

SOFARGEN® Spray

Spray
cutaneo

Patented formula

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Sofargen® ***Spray*** è una medicazione in **polvere spray** per uso topico contenente caolino leggero e **argento sulfadiazina**. Il caolino leggero crea una barriera meccanica agli agenti esterni, proteggendo la cute lesa, e nello stesso tempo drena e assorbe gli essudati. La presenza dell'argento sulfadiazina, un composto metallorganico ottenuto per reazione dell'argento nitrato con sulfadiazina, previene la contaminazione microbica della medicazione e mantiene l'ambiente della ferita libero da altri batteri esogeni. La particolare formulazione di Sofargen® Spray permette quindi di controllare gli essudati creando un ambiente che facilita il processo naturale di guarigione e fornisce una effettiva barriera alla penetrazione microbica. Il prodotto rimane agevolmente "in situ" e non è influenzato dallo stiramento dei bordi della ferita. Può essere facilmente rimosso pulendo la lesione con soluzione fisiologica.

COMPOSIZIONE:

Caolino leggero g 9,7; Sulfadiazina Argentica Micronizzata g 0,1; silice colloidale anidra g 0,1; calcio gluconato monoidrato g 0,1; butano come propellente g 70,0

INDICAZIONI:

Sofargen® ***Spray*** è indicato per il trattamento locale di lesioni cutanee di piccole dimensioni quali: abrasioni, escoriazioni, tagli, ferite ed affezioni dermatologiche in genere.

ABRASIONI | TAGLI | FERITE | LESIONI | AFFEZIONI DERMATOLOGICHE







DOSE E MODO DI IMPIEGO:

Agitare energicamente la bomboletta per qualche secondo prima dell'uso.
Dopo una opportuna detersione della lesione, assicurarsi di dirigere l'ugello dell'erogatore in direzione della lesione stessa da trattare, mantenendo in posizione verticale la bomboletta ad una distanza di circa 15 cm dalla superficie da trattare. Applicare quindi uno strato uniforme di **Sofargen®** ***Spray*** sulla lesione, premendo il tasto erogatore per pochi istanti. L'applicazione di **Sofargen®** ***Spray*** deve continuare senza interruzione una o due volte al giorno sino a completa guarigione. Ad ogni rinnovo dell'applicazione detergere accuratamente la lesione con acqua o soluzione fisiologica. La polvere contenuta in **Sofargen®** ***Spray*** tenderà a rimanere adesa alla ferita (per la presenza di essudato) o alla cute macerata, mentre sulla cute sana e asciutta circostante tenderà a rimuoversi spontaneamente. Dove opportuno o necessario dopo l'applicazione di **Sofargen®** ***Spray,*** coprire la lesione con un cerotto o un bendaggio a seconda della sua dimensione.



1

DIRETTAMENTE SULLE LESIONI MANTENENDO LA BOMBOLETTA AD UNA DISTANZA DI 15 CM



2

DOPO L'APPLICAZIONE COPRIRE LA LESIONE CON UN CEROTTO O UN BANDAGGO IN BASE ALLA SUA DIMENSIONE

PRECAUZIONI:

I pazienti con ipersensibilità individuale accertata verso i componenti non devono usare **Sofargen®** ***Spray***.
Si consiglia di non usare il prodotto per più di quattro settimane. Consultare il medico in caso di guarigione incompleta o nel caso insorgessero sintomi indesiderati. Proteggere il viso quando si spruzza nella parte superiore del corpo. Evitare di inalare la polvere nebulizzata.
In caso di ingestione o inalazione accidentali della polvere consultare il medico.

AVVERTENZE:

La polvere erogata esposta alla luce può tendere a divenire di colore bruno, a causa dello ione argento presente nella formulazione. Tuttavia questo fenomeno non compromette la sua efficacia e sicurezza. Non applicare il prodotto insieme a disinfettanti liquidi o solidi. Rimettere il tappo alla bomboletta dopo ogni applicazione. Nelle donne in stato di gravidanza e nella prima infanzia, usare il prodotto previo consiglio del medico. **Sofargen®** ***Spray*** va impiegato per il trattamento solo di piccole lesioni.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.



EFFETTI INDESIDERATI:

Si possono verificare eventualmente sensazioni transitorie di bruciore o irritazione, tuttavia senza conseguenze e rare reazioni locali di natura allergica. Qualora insorgessero effetti indesiderati consultate il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE:

Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non utilizzare il prodoto oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato. Contenitore sotto pressione e infiammabile: non forare o in alcun modo manomettere la bomboletta, anche a prodotto esaurito. Il prodotto contiene propellente infiammabile sotto pressione: non utilizzare in vicinanza di fiamme libere o fonti di calore. Non conservare alla luce solare diretta. L'esposizione a temperature superiori a 50°C può causare lo scoppio del contenitore. Dopo l'uso smaltire la bomboletta secondo le norme vigenti. Non contiene gas propellenti dannosi per l'ozono.

CONSERVAZIONE



PRESENTAZIONE: Bomboletta da 125 ml pressurizzata contenente 10g di polvere spray

ALFASIGMA

Contents 125 ml ℮

AL CE 0373 Rev.02 - 12/2023 45002766 03100238

Fabbricante:
SOFAR S.p.A.
Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) - Italia

Distributore per l'Italia
Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del'99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)